

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства для пациента

Торговое название: СТОПДИАР® (STOPDIAR)®

Международное непатентованное название (МНН): нифуроксазид (nifuroxazide)

Лекарственная форма: суспензия для внутреннего применения

Состав

5 мл суспензии содержит:

действующее вещество: 220 мг нифуроксазида;

вспомогательные вещества: карбомер, сахароза, кислоты лимонной моногидрат (E330), натрия гидроксид (E524), метилпарабен (E218), эмульсия симетикона 30%, эссенция банановая, вода очищенная.

Описание:

Суспензия светло-желтого цвета, с банановым запахом; при хранении слегка оседает, но после взбалтывания возвращается в состояние однородной суспензии, не оставляя плотного осадка на дне бутылки.

Фармакотерапевтическая группа

Кишечные противомикробные средства.

Фармакологические свойства

Нифуроксазид является производным 5-нитрофурана. Оказывает антибактериальное действие в просвете кишечника по отношению к некоторым видам грамположительных бактерий рода *Staphylococcus* и некоторым видам грамотрицательных бактерий семейства *Enterobacteriaceae* из рода *Yersinia spp.*, *Escherichia spp.*, *Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*

Нифуроксазид не проявляет антибактериальную активность в отношении бактерий вида *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* и *Pseudomonas aeruginosa*.


Нифуроксазид не уничтожает сапрофитную кишечную флору. Не вызывает появления устойчивых к нифуроксазиду штаммов. Точный механизм действия не известен. Нифуроксазид может ингибировать активность дегидрогеназ и нарушать синтез белков в бактериальных клетках. Эффективность не зависит от pH в просвете кишечника.

Нифуроксазид после перорального приема практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта. Он выводится в неизменном виде с калом.

Показания к применению

Лечение острой диареи бактериального происхождения, вызванной чувствительными штаммами *Staphylococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli* при отсутствии признаков инвазии (например, ухудшение общего состояния, повышение температуры, токсикоинфекция и др.).

Доза и способ регидратации (перорально или внутривенно) определяются в зависимости от тяжести диареи, возраста, состояния пациента, наличия сопутствующих заболеваний.

***Противопоказания***

Нифуроксазид противопоказан к применению при повышенной чувствительности к какому-либо из его компонентов, а также при аллергии на производные 5-нитрофурана. Препарат не следует применять у недоношенных детей и у детей в возрасте младше 2-х месяцев.

Предостережения при применении

В случае продолжающейся диареи после 3 дней лечения необходимо сообщить об этом лечащему врачу. Он проведёт углубленную диагностику, целью которой является определение причины симптомов, и назначит антибиотикотерапию.

Во время диареи следует продолжать прием пищи. Рекомендуются употребление жареного мяса и риса.

Во время лечения нифуроксазидом вам не следует употреблять алкогольные напитки, т.к. препарат повышает чувствительность организма к алкоголю и может спровоцировать реакцию, выраженную обострением диареи, рвотой, болью в животе, гиперемией кожи, ощущением жара в лице и верхней части туловища, шумом в голове, затрудненным дыханием, тахикардией, ощущением страха.

В случае реакций гиперчувствительности (одышка, отек лица, губ и языка, сыпь, зуд) данный лекарственный препарат следует немедленно отменить.

Требуется постоянная пероральная или внутривенная регидратационная терапия диареи (среднесуточное потребление воды для взрослого составляет около 2 литров). В зависимости от общего состояния пациента рекомендуется потребление большого количества жидкости, сладких и несладких напитков для компенсации потери жидкости вследствие диареи. Следует рассмотреть возможность проведения внутривенного восполнения жидкости в случае тяжелой и продолжительной диареи, тяжелой рвоты или анорексии.

Во время диареи следует продолжать прием пищи, исключив некоторые продукты питания, особенно сырые фрукты и овощи, тяжелые и острые блюда, а также замороженные продукты и холодные напитки. Рекомендуются употребление жареного мяса и риса.

Из-за присутствия сахарозы пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот лекарственный препарат.

В связи с тем, что данный лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат, он может вызывать аллергические реакции (возможно, замедленного типа).

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания***Применение нифуроксазида в период беременности:***

Отсутствуют клинические данные, касающиеся применения нифуроксазида в период беременности.


Поэтому, в качестве меры предосторожности, не рекомендуется использовать нифуроксазид во время беременности.

Применение нифуроксазида в период кормления грудью:

Нифуроксазид не всасывается в желудочно-кишечном тракте. Грудное вскармливание возможно в случае короткого курса лечения данным препаратом.

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Нифуроксазид не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Употребление алкоголя во время лечения нифуроксазидом может вызвать дисульфирамоподобные реакции. Во время приема нифуроксазида следует избегать одновременного приема других пероральных средств из-за сильных адсорбционных свойств препарата.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь.

Перед применением флакон следует тщательно взболтать до получения однородной суспензии. Суспензию следует проглотить сразу после отмеривания назначенной дозы. При необходимости суспензию можно запить водой.

Для точного дозирования используйте приложенные мерные ложки.

Маленькая мерная ложка на 2,5 мл содержит 110 мг нифуроксазида.

Большая мерная ложка на 5 мл содержит 220 мг нифуроксазида.

Дозы:

- дети возрастом от 2 до 6 месяцев: 1-2 маленькие мерные ложки на 2,5 мл (110 мг - 220 мг) 2 раза в сутки, каждые 12 часов;

- дети возрастом от 7 месяцев до 6 лет: 1 большая мерная ложка на 5 мл (220 мг) 3 раза в сутки, каждые 8 часов;

- взрослые и дети старше 7 лет - 1 большая мерная ложка на 5 мл (220 мг) 4 раза в сутки, каждые 6 часов.

Препарат Стопдиар следует принимать в течение 7 дней. Если после 3 дней приема симптомы не проходят, сообщите об этом вашему лечащему врачу.

Не используйте препарата дольше установленного срока (3 дня) без консультации врача!

Во время лечения острой диареи обязательным является постоянное пероральное (или внутривенное) восполнение дефицита жидкости в организме в зависимости от общего состояния пациента.

Передозировка

Специфическая информация о симптомах передозировки нифуроксазидом отсутствует.

Описан один случай передозировки нифуроксазида в форме суспензии для приема внутрь у ребенка в возрасте 2 лет, принявшего неустановленное количество препарата. Передозировка проявилась сонливостью и диареей, которые прошли самостоятельно.

В случае подозрения на передозировку нифуроксазидом рекомендуется симптоматическое и поддерживающее лечение. Необходимо тщательное наблюдение за пациентом.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы:

Частота не известна: Аллергические реакции, такие как кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок.


Со стороны кроветворной и лимфатической системы:

Описан один случай гранулоцитопении.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

В случаях индивидуальной гиперчувствительности к нифуроксазиду могут появиться боль в животе, тошнота и обострение диареи. В случае появления подобных симптомов незначительной интенсивности нет необходимости применения специальной терапии или прекращения применения нифуроксазида. При развитии вышеперечисленных симптомов

НД РБ
5800 - 2016



значительной интенсивности следует прекратить прием лекарства. В дальнейшем больному не следует принимать производные нитрофурана.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки:

Редко появляются кожные реакции в виде кожной сыпи (могут встречаться от 1 из 1000 пациентов). Описан 1 случай пустулеза у человека пожилого возраста и один случай узелковой чесотки в результате контактной аллергии к нифуроксазиду.

В случае возникновения любых нежелательных эффектов необходимо обратиться к лечащему врачу!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия флакона срок годности суспензии – 3 месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 15 °С до + 25 °С

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Флакон объемом 125 мл из темного стекла с завинчивающимся полиэтиленовым колпачком, содержащий 90 мл суспензии. 1 флакон в картонной коробке в комплекте с двойной мерной ложкой (на 2,5 мл и 5 мл) вместе с инструкцией по применению.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель: Гедеон Рихтер Румыния АО, Тыргу-Муреш, Румыния

Выпускающий контроль качества: ООО «Гедеон Рихтер Польша», Гродзиск Мазовецкий, Польша

Владелец регистрационного удостоверения: ОАО «Гедеон Рихтер», Будапешт, Венгрия

Компания, представляющая интересы производителя и заявителя:

ОАО «Гедеон Рихтер»

1103 Будапешт, ул. Дёмрёи, 19-21, Венгрия.

Телефон горячей линии (звонок бесплатный!): 7-800-555-00777

Электронный адрес: drugsafety@g-richter.ru